

Du 06 au 08  
Novembre 2019

PALAIS DU PHARO,  
MARSEILLE

Les cancers du sein de demain :  
le "big bang" ? *Prévention, Dépistage, Traitements  
et Évolutions sociétales*

41<sup>ES</sup> JOURNÉES DE LA SOCIÉTÉ  
FRANÇAISE DE SÉNÉLOGIE ET DE  
PATHOLOGIE MAMMAIRE

Organisateurs : Brigitte Séradour, Pascal Bonnier, Catherine Noguès et Anthony Gonçalves



## C42 : CANCER DU SEIN TRIPLE NÉGATIFS CHEZ LA FEMME JEUNE

### Titre

**Français :** CANCER DU SEIN TRIPLE NÉGATIFS CHEZ LA FEMME JEUNE

**Anglais :** NEGATIVE TRIPLE BREAST CANCER IN YOUNG WOMEN

### Auteurs

Hafid REMOUCHE (1), KHEDIDJA BELKHARROUBI (1), RAMZI GRAICHI (1), YASSER IKKACHE (1), OMAR BOUALGA (1), BOUABDELLAH KRELIL (1)  
(1) Chirurgie Générale et cancérologie, CHU , CHU ORAN ALGERIE, 31000, ORAN, ALGÉRIE

### Responsable de la présentation

**Nom :** REMOUCHE

**Prénom :** HAFID

**Adresse professionnelle :** CHU Oran SERVICE DE CHIRURGIE GENERALE ET CANCEROLOGIE "PAV 10"

**Code postal :** 31000

**Ville :** Oran

**Pays :** ALGERIE

**Newsletter :**

### Mots clés

**Français :** sein, chirurgie, chimiothérapie, jeune, triples négatifs, enquête génétique.

**Anglais :** breast, surgery, chemotherapy, young, triple negative, genetic survey.

### Spécialité

**Principale :** Chirurgie

**Secondaire :** Autres

### Texte

**Contexte et objectifs :** Le cancer du sein connaît une incidence qui croît avec l'âge ainsi dans la majorité des cas il survient à partir de 45 ans. La survenue du cancer du sein chez un sujet de moins de 20ans est exceptionnelle.

**Méthode et Résultat :** Nous rapportant le cas d'une patiente C.R âgée de 18 ans aux antécédents familiaux de cancer du sein chez la mère à l'âge de 40 ans, admise au service de chirurgie générale pour la prise en charge d'un nodule du sein du sein droit du quadrant supéro-externe, de 02 cm de diamètre mobile par rapport au deux plans. Echographie mammaire couplé à la mammographie : un nodule spiculé, irrégulier de 15mm de diamètre, classée ACR 5 du sein droit, sans adénopathie axillaire homolatérale; dont la biopsie exèrese est revenue en faveur d'un carcinome lobulaire, RH(-) et HER (-) ; triples négatif.

Patiente opérée, geste fait : mastectomie+ curage axillaire homolatérale.

Examen histologique : Carcinome lobulaire avec infiltration ganglionnaire 2N+/16.

Un bilan d'extension a savoir un scanner thoraco-abdomino-pelvien + scintigraphie osseuse sont revenus sans particularités.

Patiente ayant subi un complément thérapeutique à base de chimio-radiothérapie adjuvante.

**Discussion :**

Parmi ces cancers frappant les femmes jeunes, on trouve une proportion plus importante de cancers du sein triple-négatif, ces cancers présentent des risques de diffusion de métastases beaucoup plus élevé que les autres cancers du sein avec un pronostic vital très défavorable. Ils représentent jusqu'à 20 % des cas diagnostiqués dans le monde et peuvent être liés à des prédispositions génétiques (en particulier des mutations des gènes BRCA1 ou BRCA2).

**Conclusion :** Le cancer du sein triple négatif chez la femme jeune pose de nombreuse problématique aux chirurgien et aux oncologues en terme de thérapeutique ?! L'intérêt de la consultation oncogénétique.