



P13 : Plastie mammaire par la technique de Mac Kisson en milieu sous médicalisé

Titre

Français : Plastie mammaire par la technique de Mac Kisson en milieu sous médicalisé

Anglais : Breastplasty by the technique of Mac Kisson in under medicalized environment

Auteurs

Drissa TRAORE (1), Bréhima BENGALY (1), Drissa OUATTARA (1), Souleymane SANOGO (1), Moustapha DICKO (1), Birama TOGOLA (1), Siaka Diallo (1), Bréhima Coulibaly (1), Abdoulaye Kanté (1), Babou Ba (1), Mahamadou Coulibaly (1), Nouhoum ONGOÏBA (2), Anne Mourregot (3), Pierre Emmanuel COLOMBO (4), Philippe ROUANET (4)

(1) chirurgie B, CHU du Point G, Bamako , BP: 333, Bamako , Mali

(2) chirurgie B, CHU du Point G, BP: 333, BP: 333, Bamako , Mali

(3) Chirurgie A1, Institut du cancer de Montpellier , 208 rue des Apothicaires , 34090, Montpellier , France

(4) Chirurgie A, Institut du cancer de Montpellier , 208 rue des Apothicaires , 34090, Montpellier , France

Responsable de la présentation

Nom : TRAORE

Prénom : Drissa

Adresse professionnelle : Service de chirurgie B, CHU du Point G

Code postal : BP: 333

Ville : Bamako

Pays : Mali

Newsletter :

Mots clés

Français : oncoplastie, mammoplastie, réduction mammaire, gygantomastie, Mac Kisson

Anglais : oncoplasty, mammoplasty, breast reduction, gygalomastia, Mac Kisson

Spécialité

Principale : Chirurgie

Secondaire : Gynécologie

Texte

Objectif: Evaluer les résultats de la plastie mammaire par la technique de Mac Kisson dans notre service

Patients et Méthodes : Etude rétrospective et prospective portant sur les patientes opérées selon la technique de Mac Kisson entre 2015 et 2019.

Résultats : Nous avons réalisé 11 fois la technique de Mac Kisson soit 45,8% des plasties mammaires réalisées chez 6 patientes dont l'âge moyen était de 28 ans avec un écart type de 11, 4 ans et des extrêmes de 16 et de 40 ans. Les patientes étaient essentiellement des comptables (2) des inspecteurs de finance (2) et des élèves (2) et des commerçantes (2). Les principales indications de la plastie étaient : asymétrie des 2 seins dans 2 cas, gygantomastie dans 4 cas, ptose associée à l'hypertrophie mammaire dans 2 cas, hypertrophie plus malformation mammaire dans 2 cas et ptose plus nodule mammaire dans 1 cas. Deux patients ont fait une infection du site opératoire. Aucune nécrose des lambeaux n'a été enregistrée. Les patientes ont répondu très satisfaites 3 fois et satisfaisante 8 fois. La mortalité a été nulle.

Conclusion : la mammoplastie selon la technique de Mac Kisson est une technique fiable avec peu de morbidité, une mortalité nulle, un taux de satisfaction très élevé et réalisable en milieu sous médicalisé en dépit de l'insuffisance du plateau technique.