

Plastie mammaire par la technique de Mac Kissock en milieu sous médicalisé

Traoré D. Ouattara D, Bengaly B, Sanogo S, Dicko M, Sima M, Togola B, Diallo S, Coulibaly B, Kanté A, Ba B, Dicko H, Coulibaly M, Ongoïba N, Mourregot A, Colombo PE, Gutowski M, Koumaré AK, Rouanet P.

Auteur correspondant : Drissa Traoré, service de chirurgie « B » CHU du Point « G ». Bamako Mali, BP : 333, Email : traored2003@yahoo.fr

But

Evaluer les résultats de la plastie mammaire par la technique de Mac Kissock

Patients et Méthodes

Etude rétrospective et prospective portant sur les patientes opérées selon la technique de Mac Kissock entre 2015 et 2019.

Résultats

Technique de Mac Kissock réalisée 11 fois chez 6 patientes

Age moyen = 28 ans, écart type de 11, 4 ans

Indications :

- Asymétrie des 2 seins = 2
- Gigantomastie = 4
- Ptose + hypertrophie mammaire = 2
- Hypertrophie + malformation mammaire = 2
- Ptose + nodule mammaire 1 cas.

Infection du site opératoire = 2.

Nécrose des lambeaux = 0

Patientes très satisfaites 3 fois

Satisfaisante 8 fois.

Mortalité nulle.



Gigantomastie



Ptose mammaire



Ptose + hypertrophie

Conclusion

la mammoplastie selon la technique de Mac Kissock est une technique fiable avec peu de morbidité, une mortalité nulle, un taux de satisfaction très élevé et réalisable en milieu sous médicalisé en dépit de l'insuffisance du plateau technique.

Remerciements: AIPP, ICM Montpellier, SFSPM